



- Inflammatoire tinea pedis (5)
- Mocassin type (4)
- Voetzool-voetrand type (3)
- Tinea plantaris
- Ulcererende tinea pedis (2)
- Tinea pedis interdigitalis (1)


Tinea pedis

Tinea pedis

Overzicht van de schimmelinfecties aan de voeten

Type infectie	Klinisch beeld	Verwekkers
Tinea pedis interdigitalis	Maceratie tussen de tenen	T. rubrum, T. interdigitale, E. floccosum
Ulcererende tinea pedis	Ulceraties tussen de tenen	T. interdigitale
Tinea pedis plantaris, de voetzool-voetrand vorm	Erythematosquameuze afwijkingen en blaasjes	T. rubrum, T. interdigitale, E. floccosum
Tinea pedis plantaris, mocassin type	Erythematosquameuze afwijkingen, eelt	T. rubrum, T. interdigitale
Inflammatoire tinea pedis	Blaasjes en blaren	T. interdigitale, T. rubrum

- Distale latrale onychomycosis
- Oppervlakkige witte onychomycosis
- Proximale subunguale onychomycosis



Invasieroute	Klinisch beeld
De latrale nagelplaat (de zijkant)	Distale en latrale subunguale onychomycose
De proximale nagelplaat (het vrije uiteinde)	Distale en latrale subunguale onychomycose
De proximale nagelwiel	Proximale subunguale onychomycose
Via de bovenzijde van de nagelplaat	Oppervlakkige witte onychomycose

Onychomycose

Onychomycose

Naam	Klinisch beeld	Verwekker
Distale en laterale subunguale onychomycose	Zijkanten en uiteinden van de nagel	T. rubrum en T. interdigitale
Oppervlakkige witte onychomycose	Witte vlekken in het bovenste gedeelte van de nagel	T. interdigitale, T. rubrum
Proximale subunguale onychomycose	Wit vanuit de proximale nagelrand	T. rubrum

- Als in eerderde gevallen met een lokaal preparaat genezing werd bereikt, is er geen bezwaar tegen herhaling van deze behandeling.
- Tinea pedis, tinea manus, tinea corporis kunnen frequent recidiveren.
- Tegen lokale antimycotica is echter op een lokaal antimycicum uit een andere groep. Resistentie ontstaat bij uitblijven van genezing kan het zinvol zijn over te schakelen tegen lokale antimycotica is echter heroverweeg de diagnose.
- Bij onvoldoende effect het medicijngebruik na en huidgedeelte aan huidgevoel tot ongeveer 2 cm buiten het aangedane gebied.
- Breng de crème tot ongeveer 2 cm buiten het aangedane gebied een lokaal antimycicum.
- Geef bij een voetschimmel gedurende maximaal vier weken 2 dd een lokaal antimycicum

groep	stoersem	merknaam	werkzaam tegen dermatofyt infecties	werkzaam tegen gif infecties	toedieningsvorm	vergoeding	receptplichtig	30 gr	veilig tijdens borstvoeding	veilig tijdens zwangerschap
imidazolen	aztreonol	Mycospor	ja	ja	creme 1% hydrogel lotion strooppoeder hydrofiele crème 1% huidspray strooppoeder 2%	nee	nee			
	clotrimazol	Caneften	ja	ja	hydrofiele crème 1% huidspray strooppoeder 2%	nee	nee			
		merkloos			hydrofiele crème 1% zalf 1% creme 1% huidspray 1% smeersel 1%	nee	nee	8,49-12,12		3,78
	econazol	Reveryl	ja	ja	creme 1% huidspray 1%	nee	nee			
	ketoconazol	Nizoral crème	ja	ja	creme 2% zalf 2% hoopteel 20mg/g creme 2% zalf 2%	ja	ja			6,24
		merkloos			creme 2% zalf 2% strooppoeder 2%	nee	nee	5,95-14,31		
	micronazol	Daktarin	ja	ja	creme 2% zalf 2% strooppoeder 2% oplossing 100 mg/ml orale po 20 mg/5 ml	nee	nee	6,30-13,02		
		Dermacure			creme 2% strooppoeder 2%					
		merkloos			creme 2% strooppoeder 2%					
		FNA			zinkoxydpoeder zinkoxydcerumen					
Hydroxypyridonderdaet	Sulconazol ciclopirox	Myk Loprox	ja	ja	hydrofiele crème 1% hydrofiele crème 1% hydrofiele crème 1%	ja	ja			4,05
Alylamine	terbinafine	Lamisil merkloos	ja	ja	creme huidspray oplossing gel					10,88
		DermGel								
	nystatin		nee	ja	creme 100.000 U/g zalf 100.000 U/g					
	amphotericine B	Fungizone	nee	ja	susp 1.400.000 susp 1.000 mg/ml taai 100 mg zuigtablet 10 mg					
	fluconazol	Diflucan	ja	ja	10 mg/ml					